

ПАТОЛОГІЧНІ РОДИ У СВИНОМАТОК

Кива О.В., Бородиня В.І.

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна, rectorat@nubip.edu.ua

Патологічні роди – це такий перебіг стадій родів, коли вони не можуть самостійно закінчитися народженням живого та здорового приплоду та своєчасним відділенням та вигнанням з матки фетальної частини плаценти та навколоплідних рідин. Перебіг патологічних родів несе за собою ризик післяродових ускладнень, що відповідно впливає на майбутню відтворну здатність маточного поголів'я, інтенсивність його використання, а також призводить до економічних збитків господарства. Причинами патологічних родів можуть бути: порушення анатомо-топографічних взаємовідношень між родовими шляхами та тілом плода, невідповідність родового каналу розмірам плода, слабкість родової діяльності, наявність механічних перешкод у родових шляхах, некваліфіковане втручання у перебіг родового акту. Серед патологій родових шляхів у свиноматки може бути вузька вульва, вузька піхва, звуження каналу шийки матки, сухі роди. Найчастіше вони бувають у первісток, а у повновікових – при порушенні динаміки родового акту в результаті недостатнього перетворення звичайного таза у родовий, за наявності рубців на стінці вульви, піхви або новоутворень. Патологія плодів проявляється у вигляді їх надмірних розмірів, недорозвиненості, виродливості, неправильного їх положення, передлежання, позиції та членорозміщення. Патологія родових сил клінічно проявляється у вигляді слабкості чи відсутності переймів і потуг або ж їх бурхливим проявом. За патологічного перебігу родів період розслаблення м'язів таза перед родами скорочується і, відповідно, зменшується відстань від кореня хвоста до сідничних горбів приблизно у 2 рази, збільшується тривалість підготовчої стадії, стадії виведення плодів та стадії виведення посліду, а також середній інтервал між народженням поросят. Переширення тривалості всіх стадій за патологічних родів над фізіологічними зберігається у всіх вікових групах в усі пори року. Основною ознакою патологічних родів у свиноматок є затримання виведення плодів. За наявності в гнізді чотирнадцяти і більше плодів всі роди зазвичай мають патологічний перебіг. Найпоширенішими проявами патологічних родів у свиноматок є: наявність у гнізді

мертвонароджених поросят, аспіраційна асфіксія новонароджених поросят, затримання посліду або його частини, недорозвинення плодів, первинна або вторинна слабкість переймів і потуг, перерозвиток плодів, вузькість тазу, надмірні перейми і потуги. Наслідками патологічних родів часто стають загибель плодів, загибель свиноматки, післяродові ускладнення та захворювання, неплідність, та бракування тварин, що призводить до економічних збитків. Висновок. Таким чином, причини, прояв і наслідки патологічних родів у свиноматок різноманітні і потребують подальшого детального вивчення.